4º A eso - FÍSICA Y QUÍMICA - 3ª evaluación - 16 junio 2010

- 1º - El análisis de una muestra de un compuesto puro presenta el siguiente resultado: 52,17% de C, 13,04% de hidrógeno y el resto oxígeno. Si su masa molecular es de 138, calcule sus fórmulas empírica y molecular
- 2º - Calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 g de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 5 litros a una presión de 790 mm Hg . ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? ¿Qué cantidad de dicho gas debería salir o deberíamos introducir para que se duplicara la presión en el primer recipiente, si la temperatura desciende 10°C?
- 3º - Un recipiente de 10 l. se llena de hidrógeno a 25°C y 770 mm de presión. Determinar la cantidad que se ha introducido, expresándola en gramos, moles y moléculas. ¿Qué cantidad saldría si se abre el recipiente y en el exterior la presión es de 1 atm?
- 4º - Se disuelven 0,005 kg de HCl en 0,035 kg de agua. Sabiendo que la densidad de la disolución es de 1,060 kg/L y las masas atómicas del cloro e hidrógeno son respectivamente 35,5 y 1 . Calcule todas las expresiones de la concentración de esta disolución.
- 5º - a) Defina los siguientes conceptos: MOL, ÁTOMO , DISOLUCIÓN , GAS IDEAL
B) Deduzca la ecuación de Clapeyron para los gases partiendo de la ecuación general de los gases

DATOS: Masas atómicas: Al = 27 ; B = 11 ; C = 12 ; Ca = 40 ; Cl = 35,5 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; H = 1 ; O = 16 ; S = 32

SOLUCIONES

- 1º - El análisis de una muestra de un compuesto puro presenta el siguiente resultado: 52,17% de C, 13,04% de hidrógeno y el resto oxígeno. Si su masa molecular es de 138, calcule sus fórmulas empírica y molecular

RESOLUCIÓN

Se parte de una muestra de 100 g de ese compuesto, por lo que teniendo en cuenta su composición centesimal, las cantidades de cada uno de los tres elementos son sus porcentajes: 52,17 g de C, 13,04 g de H y (100 - 52,17 - 13,04) = 34,79 g de Oxígeno.

Calculamos ahora el número de átomos-gramo de cada elemento que hay en esas cantidades, para lo cual hemos de dividir la cantidad de cada uno entre su masa molecular:

$$\text{N}^\circ \text{ átomos-gramo de C} = 52,17 / 12 = 4,35$$

$$\text{N}^\circ \text{ átomos-gramo de H} = 13,04 / 1 = 13,04$$

$$\text{N}^\circ \text{ átomos-gramo de O} = 34,79 / 16 = 2,17$$

Y esta es la proporción, expresada en átomos-gramo en que entran en la fórmula, pero como deben ser números enteros, suponemos que el elemento del cual hay menos cantidad hay solamente un átomo-gramo, para lo cual dividimos las tres cantidades por la más pequeña,

$$\text{C}_{4,35} \text{H}_{13,04} \text{O}_{2,17} \implies \frac{\text{C}_{4,35}}{2,17} \frac{\text{H}_{13,04}}{2,17} \frac{\text{O}_{2,17}}{2,17} \implies \text{C}_2 \text{H}_6 \text{O} \quad \text{de forma que la fórmula empírica es:}$$

Y su masa molecular: $n \cdot (2 \cdot 12 + 6 \cdot 1 + 16) = 46 \cdot n$ y esta cantidad se nos insica en el enunciado: es 138, por tanto

$$46 \cdot n = 138 ; n = 3, \text{ de manera que la fórmula molecular es } (\text{C}_2 \text{H}_6 \text{O})_3 \implies \text{C}_6 \text{H}_{18} \text{O}_3$$

- 2º - Calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 g de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 5 litros a una presión de 790 mm Hg . ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? ¿Qué cantidad de dicho gas debería salir o deberíamos introducir para que se duplicara la presión si la temperatura desciende 10°C?

RESOLUCIÓN

En este caso le son aplicables las ecuaciones generales de los gases ideales:

$$P \cdot V = \frac{g}{P_m} \cdot R \cdot T \Rightarrow \frac{790}{760} \cdot 5 = \frac{8}{32} \cdot 0,082 \cdot T ; T = \frac{790 \cdot 5 \cdot 32}{760 \cdot 8 \cdot 0,082} = 253,5^\circ \text{K} = -19,5^\circ \text{C}$$

En C.N. ocupa: $1 \cdot V = \frac{8}{32} \cdot 0,082 \cdot 273 ; V = 5,60$ litros en C.N.

En el tercer caso la cantidad de gas que hay dentro del recipiente es:

$$2 \cdot \frac{790}{760} \cdot 5 = \frac{g}{32} \cdot 0,082 \cdot 243,5 ; g = \frac{2 \cdot 790 \cdot 5 \cdot 32}{760 \cdot 0,082 \cdot 243,5} = 16,66 \text{ g hay dentro,}$$

por lo que deben INTRODUCIRSE 8,66 gramos, ya que antes solamente había 8 gramos

3º - Un recipiente de 10 l. se llena de hidrógeno a 25°C y 770 mm de presión. Determinar la cantidad que se ha introducido, expresándola en gramos, moles y moléculas. ¿Qué cantidad saldría si se abre el recipiente y en el exterior la presión es de 1 atm?

RESOLUCIÓN

La cantidad de gas, podemos expresarla en moles o en gramos, teniendo en cuenta que el peso molecular del H₂ es: 2 . 1,0 = 2,0 . Y la calculamos por medio de la ecuación general de los gases ideales aplicada a ese recipiente:

$$P = 770 \text{ mm Hg} = \frac{770}{760} \text{ atm}$$

$$V = 10,0 \text{ l}$$

$$T = 25^\circ \text{C} = 25 + 273 = 298^\circ \text{K}$$

$$\text{N}^\circ \text{ de moles} = ?$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow \frac{770}{760} \cdot 10,0 = n \cdot 0,082 \cdot 298 \Rightarrow$$

$$n = \frac{770 \cdot 10,0}{760 \cdot 0,082 \cdot 298} = 0,415 \text{ moles}$$

$$0,415 \cdot 2,0 = 0,83 \text{ gramos de H}_2$$

$$\text{N}^\circ \text{ moléculas} = 0,415 \cdot 6,023 \cdot 10^{23} = 2,5 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

Cuando ese recipiente se abre y se pone en contacto con el exterior, saldrá Hidrógeno hasta que la presión interior se haga igual que la exterior, que es 1 atm, por lo que vamos a utilizar la ecuación general de los gases ideales, teniendo en cuenta que al tratarse del mismo recipiente, el volumen no cambia, ni tampoco la temperatura, por lo que tendremos::

CONDICIONES INICIALES
P = 1 atm
V = 10,0 litros
T = 25°C = 298°K

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow 1 \cdot 10,0 = n \cdot 0,082 \cdot 298 \Rightarrow$$

$$n = \frac{1 \cdot 10,0}{0,082 \cdot 298} = 0,409 \text{ moles}$$

$$0,409 \cdot 2,0 = 0,818 \text{ gramos de H}_2 \text{ que quedan dentro}$$

Por lo que si antes de abrir el recipiente teníamos 0,830 g y ahora nos quedan 0,818, habrán salido:

$$0,830 - 0,818 = 0,012 \text{ g de H}_2 \text{ que salen del recipiente al abrirlo}$$

4º - Se disuelven 0,005 kg de ClH en 0,035 kg de agua. Sabiendo que la densidad de la disolución es de 1,060 kg/L y las masas atómicas del cloro e hidrógeno son respectivamente 35,5 y 1 . Calcule todas las expresiones de la concentración de esta disolución.

RESOLUCIÓN:

Las cantidades correspondientes de soluto, disolvente y disolución son:

	Soluto	Disolvente	Disolución	
Masa	5	35	40	g
Volumen	-----		37,74	mL

El volumen de la disolución se obtiene a partir de su densidad, que es: 1,060 Kg/L = 1,060 g/mL:

$$d = \frac{m}{V}; 1,060 = \frac{40}{V}; V = 37,74 \text{ mL}$$

Y con todos estos datos, podemos calcular ya todas las expresiones de la concentración:

$$\text{g/L: } \frac{g}{L} = \frac{g_{\text{SOLUTO}}}{L_{\text{DISOLUC}}} = \frac{5}{0,03774}; \text{ g/L} = 132,48 \text{ g/L}$$

$$\% \text{ en peso: } \% \text{ peso} = \frac{g_{\text{SOLUTO}}}{g_{\text{DISOLUC}}} \cdot 100 = \frac{5 \cdot 100}{40}; \% \text{ en peso: } 12,5\%$$

$$\text{Partes por millón (P.P.M.): } \left. \begin{array}{l} 40 \text{ ----- } 5 \\ 1.000.000 \text{ --- } x \end{array} \right\} x = \frac{5.1000000}{40} = 125.000 \text{ ppm}$$

$$\text{Molaridad: } M = \frac{g_{\text{SOLUTO}}}{Pm_{\text{SOLUTO}} \cdot L_{\text{DISOLUC}}} = \frac{5}{36,5 \cdot 0,03774}; M = 3,63 \text{ Molar}$$

$$\text{molalidad: } M = \frac{g_{\text{SOLUTO}}}{Pm_{\text{SOLUTO}} \cdot Kg_{\text{DISOLVENTE}}} = \frac{5}{36,5 \cdot 0,035}; M = 3,91 \text{ Molar}$$

$$\text{Fracción Molar: } X = \frac{n_{\text{SOLUTO}}}{n_{\text{TOTAL}}} = \frac{\frac{g_{\text{SOLUTO}}}{Pm_{\text{SOLUTO}}}}{\frac{g_{\text{SOLUTO}}}{Pm_{\text{SOLUTO}}} + \frac{g_{\text{DISOLVENTE}}}{Pm_{\text{DISOLVENTE}}}} = \frac{\frac{5}{36,5}}{\frac{5}{36,5} + \frac{35}{18}}; X = 0,066$$